RUDIS®

1 L

Toelatingsnr.:12970 N W2

Fungicide

in de teelt van rode kool, savooien kool, spitskool, witte kool, spruitkool, bloembollen en -knollen en prei



WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT

Toegestaan is uitsluitend het gebruik als schimmelbestrijdingsmiddel door middel van een:

1. gewasbehandeling in de onbedekte teelt van:

a. rode kool, savooien kool, spitskool, witte kool en spruitkool;

b. prei;

c. bloembol- en bloemknolgewassen.

2. dompelbehandeling, mits toegepast kort voor planten, ten behoeve van de teelt van bloembol- en bloemknolgewassen.

Om resistentieopbouw te voorkomen mag u dit product of andere producten die prothioconazool bevatten, niet vaker gebruiken dan drie maal per jaar.

Om in het water levende organismen te beschermen is in de periode van februari t/m augustus de toepassing in percelen die grenzen aan oppervlaktewater uitlsuitend toegestaan indien gebruik wordt gemaakt van 75% driftreducerende doppen.

Om in het water levende organismen te beschermen is de toepassing middels een luchtvaartuig niet toegestaan op percelen die grenzen aan oppervlaktewater.

Veiligheidstermijn:

De termijn tussen de laatste toepassing en de oogst mag niet korter zijn dan: 21 dagen voor de teelt van rode kool, savooien kool, spitskool, witte kool, spruitkool en prei.

Dit middel is uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik.

GEBRUIKSAANWIJZING

Algemeen

RUDIS is een preventief en curatief werkend middel ter bestrijding van diverse soorten schimmelziekten (met uitzondering van Oömyceten) in de teelt van diverse soorten kool, prei en bloembollen en -knollen.

Toepassingen

Gewasbehandelingen

In de onbedekte productieteelt van rode kool, savooien kool, spitskool, witte kool en spruitkool, ter bestrijding van ringvlekkenziekte (*Mycosphaerella brassicicola*). Zodra een aantasting wordt waargenomen een behandeling uitvoeren. De behandeling zonodig herhalen (na minimaal 3 weken). RUDIS toepassen in combinatie met een uitvloeier.

Dosering: 0,4 liter middel per hectare

In de onbedekte productieteelt van prei, ter bestrijding van roest (*Puccinia Allii*) en purpervlekkenziekte (*Altemaria porri*). Zodra een aantasting wordt waargenomen een behandeling uitvoeren. De behandeling zonodig herhalen. RUDIS toepassen in combinatie met een uitvloeier.

Dosering: 0,4 liter middel per hectare

In de onbedekte teelt van bloembol- en bloemknolgewassen, ter voorkoming van aantasting door vuur (veroorzaakt door *Botrytis spp*). Rudis toepassen met intervallen van 7 tot 10 dagen.

In de knollenteelt van gladiolen kunnen bespuitingen op sommige cultivars lichte vlekjes op de bladeren veroorzaken. Deze vlekjes beïnvloeden de knolproduktie niet.

Uit oogpunt van resistentiemanagement steeds toepassen in afwisseling met andere voor de vuurbestrijding toegelaten middelen met een ander werkingsmechanisme en mengen met middelen als maneb en mancozeb (gemengd gespoten met middelen als maneb en macozeb kan de dosering van Rudis naar 0,25 liter per hectare).

In die bloembol- en knolgewassen waar nog geen ervaring is opgedaan met Rudis raden wij aan om door middel van een proefbespuiting eerst ervaring op te doen met het middel alvorens een geheel perceel te behandelen.

Dosering: 0,4 liter middel per hectare

Dompelbehandelingen

In deze gebruiksaanwijzing is voor de toepassing voor bloembollen/knollenplantgoed steeds uitgegaan van een standaard ontsmettingswijze waarbij gestreefd dient te worden naar minimale resten door opgebruik.

Bloembol- en bloemknolgewassen, ter voorkoming van aantasting door Fusarium oxysporum spp. Het plantgoed voor het planten gedurende 15 minuten ontsmetten in een oplossing van RUDIS.

Dosering: 0,2% (200 ml per 100 liter water).

Maximaal 625 liter ontsmettingsvloeistof per ha toepassen. Indien de opname van de ontsmettingsvloeistof hoger is dan 625 liter dan maximaal 1,25 liter RUDIS per hectare via de ontsmettingsvloeistof meegeven.

Veiligheidsaanbevelingen bij herbetreding:

Na een gewasbehandeling uitsluitend herbetreden nadat de spuitvloeistof is opgedroogd. Tijdens gewaswerkzaamheden en oogsten/snijden gedurende 7 dagen na de toepassing geschikte beschermende kleding en handschoenen dragen.

Deze gebruiksaanwijzing is opgesteld volgens de laatste inzichten. De gegevens over eigenschappen en toepassingen van onze producten beantwoorden aan de –na zorgvuldig onderzoek - opgedane ervaringen. Veel factoren buiten de invloed van Bayer CropScience zoals onder meer opslag, vervoer, de wijze van toepassing, de teeltwijze, de dosering etc. kunnen de werking van het product beïnvloeden, zodat Bayer CropScience in verband hiermee geen enkele aan sprakelijkheid kan accepteren. Overigens zijn onze Algemene Verkoopvoorwaarden van kracht.

Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor mens en milieu te voorkomen

Productnaam: RUDIS

Toelatingsnr.: 12970 N - W2

Werkzame stof: prothioconazool.
Gehalte: 480 g/l
Aard van het preparaat: suspensie concentraat

Waarschuwingzinnen:

Vergiftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.

Mogelijk gevaar voor beschadiging van het ongeboren kind.

Veiligheidsaanbevelingen:

Niet roken tijdens gebruik.

Draag geschikte handschoenen en beschermende kleding.

In geval van inslikken onmiddelijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen.

Voorkom lozing in het milieu. Vraag om speciale instructies / veiligheidsgegevenskaart.



Schadelijk



Milieugevaarlijk

STORL VERPAKKING Deze verpakking is bedrijfsafval,mits deze is schoongespoeld zoals wettelijk is voorgeschreven.

UN 3082

Toelatingshouder:
Bayer CropScience B.V.
Postbus 231
3640 AE Mijdrecht
Tel. 0297-280618

Partijnummer/Productiedatum: zie verpakking
Stand: 22-7-2009
Art.05700158

NL05997797H

4 000680 074168

Bayer CropScience